

رعاية طفلك المصاب بالتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي (إنفلونزا المعدة)

- إذا لم يكن من الممكن لك إعطاء سوائل لطفلك/تك واستمرّ الإسهال لما يزيد عن 24 ساعة
- إذا كان ممكنا إعطاء طفلك/تك سوائل ولكن الإسهال يستمرّ لأكثر من 7 إلى 10 أيام
- إذا استمرت طفلك/تك في حلقات مفرطة من الإسهال المائي في اليوم



-----منشور معلومات خاص بالوالدين-----
المستشفى الملكي للأطفال
في غلاسكو

- ضع/ي طبقة كثيفة من كريم الحفاض المحتوي على الزنك، مثل Sudocrem™، بعد تنظيف المؤخرة جيدا وبرفق.
- اغسل/ي يديك جيدا بعد كل مرة غيرت فيها الحفاض

متى ينبغي علي الاتصال بطبيبي/تي؟

اتصل/ي بالطبيب/ة إذا كنت قلقة/ة بشأن إصابة طفلك بالجفاف. قد يسبب القيء والإسهال والحمى وفقدان الشهية أحيانا في فقدان طفلك لكميات أكبر من السوائل مقارنة بالتالي يحتفظ بها جسمه، مما قد يؤدي إلى إصابته بالجفاف. أعراض الإصابة بالجفاف هي:

- جفاف الفم
- ضمور العينين
- عطش شديد
- انحباس البول لمدة 8 إلى 12 ساعة أو خروج كميات ضئيلة من البول الداكن
- شعور أكبر بالنعاس مقارنة مع مرض عادي
- البكاء بدون دموع

اتصل/ي بالطبيب/ة في الحالات التالية:

- إذا كان عمر الرضيع أقل من ستة أشهر
- إذا استمر طفلك في التقيؤ (خصوصا إذا كان لون القيء أخضر أو بنيا أو كان به دم) ولم يقدر على الاحتفاظ بالسوائل
- إذا احتوى براز طفلك على دم

تنويه إخلاء المسؤولية:

إن المعلومات الطبية الواردة في هذا المنشور هي لأغراض تثقيفية فقط. لا يجوز الاستعانة بهذه المعلومات كبديل عن العلاجات الطبية والنصائح المقدمة من طرف طبيبك/تك. ينبغي عليك الاتصال دائما بالطبيب/ة إذا كنت قلقة/ة بشأن صحة طفلك. قد يوصي طبيبك/تك بعلاجات أخرى بناء على الظروف الخاصة بطفلك.

